

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

573

Tamaño: Pequeño.

Forma: Ovoide. Apuntada hacia el pedúnculo sin llegar a formar cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado.

Cavidad del pedúnculo: Nula. **Pedúnculo:** Mediano o largo. Grosor irregular, bastante ancho en la parte superior donde se encuentran una o más señales de yemas estrechándose a partir de cada una de estas señales volviendo a ensancharse en la base donde es carnoso. Color amarillo verdoso, parcialmente ruginoso. Recto o curvo y retorcido; a veces formando ángulo en alguna de las iniciaciones de yemas. Implantado generalmente derecho, como prolongación del fruto y confundiéndose con éste.

Cavidad del ojo: Nula. Borde suavemente ondulado. **Ojo:** Grande, abierto, forma irregular, a veces ligeramente prominente. Sépalos muy largos, triangulares, extendidos, con frecuencia con pequeñas protuberancias carnosas a su alrededor o entre ellos.

Piel: Lisa, fina, brillante. **Color:** Amarillo verdoso pálido con chapa variable desde inexistente hasta cubrir la cuarta parte del fruto, sonrosada. Punteado débil, poco perceptible sobre el fondo, destacando sobre la chapa debido a estar sobre ésta aureolado de rosa o carmín. Zona poco extensa, ruginosa y áspera, formando maraña, no siempre presente, alrededor del ojo. El resto del fruto con alguna manchita aislada o totalmente limpio.

Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto muy largo y ancho, ensanchándose aún más hacia el corazón.

Corazón: Grande, mal delimitado. Eje mediano o amplio, hueco o relleno. Celdillas extraordinariamente amplias, elípticas, ligeramente bifurcadas y puntiagudas en la parte interior.

Semillas: Medianas o grandes. Alargadas con cuello muy largo y acusado, espolonadas, el espolón suele ser muy marcado y puntiagudo. Color castaño rojizo oscuro, no uniforme.

Carne: **Sabor:** Muy dulce.

Maduración: Invierno.

